DAÑINO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“CONSÉRVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

HERBICIDA FENOXI FORMULADO COMO
CONCENTRADO SOLUBLE
USO AGRÍCOLA

DMA* 6

INGREDIENTE ACTIVO:

2,4-D Amina..... 720 g/l de equivalente ácido a 20°C

HERBICIDA SISTÉMICO Y SELECTIVO PARA EL CONTROL DE MALEZAS DE HOJA ANCHA EN POTREROS, CULTIVOS DE CEREALES, CAÑA DE AZÚCAR, MAÍZ Y ARROZ

Reg. M.A.G.: 003-H 24
Reg M.S.P.

“ESTE HERBICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA LEY 073 REGISTRO OFICIAL 442 DE DE 1990 - 05 - 22”

FABRICADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Transversal 18 No. 96-41 Piso 7o.
Bogotá-Colombia

Dow AgroSciences MR

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
PRONACA
Los Naranjos No. 4415 y Av. De los Granados
Telf 593 2 226-3651
Quito, Ecuador

INDIA

*Marca Registrada de Dow AgroSciences LLC
P.V.P.

DAÑINO

MODO DE EMPLEO:
DMA* 6 se usa en mezcla con agua formando una solución. Llene el depósito hasta ¾ de la capacidad, agregue la dosis del herbicida recomendada y agite frecuentemente para homogenizar la solución, luego complete el resto de agua y aplíquese. Se recomienda aplicar con un volumen de 200 a 400 litros de agua por hectárea.

CULTIVO	DOSIS (l/ha)	FRECUENCIA APLICACIÓN	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
ARROZ *(Oryza sativa)*	0,71 - 1,15	Aplicar en post-emergencia 4-5 semanas después de nacido		
PASTOS	1,5 - 3,0	Aplicar en malezas jóvenes, en pleno crecimiento activo, los pastos recién sembrados no deben ser tratados sino. hasta después del 3er corte. Luego de la aplicación no pastorear hasta 3 semanas.	Clavo de agua Malva Chamico Chilca Siempre viva Lechosa	*(Jussiaea linifilia)* *(Malva silvestre)* *(Datura straminium)* *(Clasidium sp.)* *(Commelina difusa)* *(Euphorbia)*
MAÍZ *(Zea mays)*	0,15 - 0,17	Post-emergencia en plantas de maíz con una altura de 20-25c, aplicación dirigida a la calle.	Pega pega Helecho Batatilla Bijao Lengua de vaca Matacaballo	*(Eterophylia)* *(Desmodium sp.)* *(Pteridium aquilinum)* *(Ipomoea sp.)* *(Heliconia sp.)* *(Rumex crispus)*
TRIGO *(Triticum sp.)* **CEBADA** *(Ordeum vulgare)*	0,75 - 1,75	Aplicar al inicio del macollaje hasta poco. antes del inicio del encañado		
CAÑA DE AZÚCAR *(Sacharum sp.)*	1,25 - 2,00	Pre-emergencia 7-10 días antes de la siembra. Post-emergencia después del brote o soca, evitando mojar el tallo.		

COMPATIBILIDAD: DMA* 6 es compatible con la mayoría de plaguicidas usados comúnmente. Sin embargo, en caso de duda se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad.

INTERVALO DE SEGURIDAD: En potreros esperar 7 días después de la aplicación para el pastoreo. En el resto de cultivos el tiempo viene determinado por la época de la aplicación. Se descompone rápidamente en el suelo por lo cual no existe peligro de efectos fitotóxicos en siembras posteriores.

AVISO AL COMPRADOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente excesivo o indebido por parte del consumidor.

PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO
Categoría Toxicológica II

Precaución: El producto puede ser nocivo si se ingiere o se inhala e irritante en caso de contacto con la piel y los ojos

Durante la preparación y utilización del producto:
NO FUMAR - COMER O BEBER

Evitar la ingestión, inhalación de vapores o sustancias nebulizadas y el contacto del producto con la boca, la piel y los ojos.

Usar guantes o botas de goma, gafas y ropa de protección.

Después de la aplicación y antes de comer-beber o fumar, sacarse la ropa contaminada, lavarse con abundante agua y jabón las manos y las partes expuestas de la piel y lavar perfectamente todo el equipo utilizado.

FRASES DE ADVERTENCIA

- El producto debe manejarse siguiendo las buenas prácticas agrícolas y las normas de manejo seguro de plaguicidas.
- Conservar el producto lejos de bebidas, alimentos y medicamentos de consumo humano o animal.
- No emplear el envase para ningún otro fin. Destrúyalo y entierre en lugar seguro.
- En caso de derrame recoja el producto con un material absorbente y entiérrelo en un lugar seguro.
- No aplicar el producto en las superficies que pueden entrar en contacto con los alimentos.
- Antes de destruír el envase enjuagarlo con agua (cuarta parte del contenido) por lo menos tres veces y los residuos viértalos en el equipo de aplicación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No permita que la aspersión caiga sobre plantas susceptibles como alfalfa, hortalizas, algodón. No efectuar aplicaciones con el viento dirigido hacia cultivos susceptibles.
- No sembrar cultivos de hoja ancha en áreas tratadas hasta asegurarse que no existen residuos en el suelo.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS

- En caso de **CONTAMINACIÓN** sacar al paciente del área tratada, quitarle la ropa contaminada y lavar las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón.
- Para el caso de **INGESTIÓN** no existe antídoto específico. **INDUZCA EL VÓMITO.**
- En caso de **INHALACIÓN** sacar al paciente del área en peligro y llevarlo a un lugar fresco y ventilado. **Consultar a un médico y mostrarle la etiqueta.**
- Si hay contacto con los **OJOS** lávese con abundante agua durante 15 minutos. **Consulte un oftalmólogo.**

Síntomas: Náuseas, debilidad, letargo y anorexia.
Diagnóstico: El contacto puede causar irritación moderada o quemaduras.
Tratamiento: Induzca inmediatamente el vómito dando a beber 2 vasos de agua tibia con sal. El tratamiento es sintomático. No existe antídoto específico.

Para mayor información diríjase a **Pronaca.**
Los Naranjos No. 4415 y Av. De los Granados Telf 593 2 226-3651. Quito, Ecuador.